៥.គ្រប់គ្រងធម្មជាតិដី និងការដាក់ជី

កំរិតនៃការដាក់ជី អាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម ត្រូវប្រើប្រាស់ទៅ តាមជីជាតិដី ប្រភេទដី និងប្រភេទពូជស្រូវ។ ការដុតគល់ជញ្ជាំង ធ្វើអោយបាត់បង់អាសូត និងស្ពាន់ធ័រ។ ការប្រមូលគល់ជញ្ជាំងពីស្រែធ្វើអោយបាត់បង់ជីជាតិដី និងដីរិចរិល។

ជីអ៊ុយរ៉ា ស៊ូរ៉ា

» គួរពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ជីដែលមានស័ង្កសី ចំពោះដីខ្សាច់ ដីដែលមានប៉េហាស់ខ្ពស់ (លើសពី៧) ឬដីស្រែដែលមិនមានលទ្ធភាពបញ្ចេញបញ្ជូលទឹក និងដីដែលជាប់ទឹកជាប្រចាំ។ **ស៊ូរ៉ា** ជាជីអ៊ុយរ៉ា ពិសេសស្រោបដោយស័ង្កសី ពិសេសបំផុតសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។

ជី យ៉ារ៉ា លីវ៉ា នីត្រាម៉ា

» គួរពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ជី កាល់ស្យូមលើដី ដែលមានប៉េហាស់ក្រោម៥.៥ ឬប្រហាក់ប្រហែល ឬដីស្រែដែលយកចម្បើង ចេញពីស្រែជាញឹកញាប់។ ប្រើប្រាស់ជី **នីត្រាម៉ា** នៅវគ្គកំណកកួរ ចន្លោះ ២៥គ.ក ទៅ ៥០គ.ក ក្នុងមួយហិចតា។

យូមិក ការ៉ី ជីបង្កើនគុណភាពដី

» ការប្រើប្រាស់ពពួកយូមិកអាស៊ីត ដើម្បីអោយដំណាំមានប្រព័ន្ធឫសរឹងមាំ ដំណាំបឺតយកជីបានល្អ កាត់បន្ថយជីពុលសរីរាង្គ ពុលជាតិដូរ និងជួយបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់។ ប្រើ **យូមិក ការ៉ី** ៥គ.ក ទៅ ១០គ.ក ក្នុងមួយហិចតា ដោយលាយជាមួយជីបាច។

៦.ការបាញ់ថ្នាំ

» ជម្រុញលូតវែងលឿន ពន្លូតដើម កក្តារវែង ស្មែងច្រើន៖ ប្រើ **ទាំអេន** ឬ **ជីប៊ីស្ពេច**

» ជម្រុញបែកគុម្ព ដើមធំថ្នោសទប់ការលូតកំពស់ និងការដួល៖ ប្រើ **ឌីឡេយ៍** ឬ **ស៊ូតស្ពុប**

» ប្រើជំរុញលូតលាស់លឿន ពេលបាញ់ថ្នាំជំងឺ ប្រើ **អាមីណូស៊ីវីត**

» ជំណាំធន់នឹងជំងឺ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់៖ ប្រើ **ហ្ស្ពេនខេ** ៥០មល លាយទឹក២៥លីត្រ ប្រើចន្លោះ៤ទៅ៥ដង ចាប់ពីវគ្គលូតលាស់រហូតដល់ទុំ



» ដើមធំថ្នោស៖ ប្រើ **Dr. Yield 28SL**

» ជម្រុញបែកគុម្ព កំណកកួរ លឿន ៖ ប្រើ **Dr. Yield 29SL**

» ដាក់គ្រាប់ពេញ ណែន ទម្ងន់ ធ្ងន់៖ ប្រើ **Dr. Yield 30SL**

angkorgreen@yahoo.com
www.angkorgreen.com.kh
facebook/angkor.green
youtube/angkorgreen

ANGKOR GREEN INVESTMENT AND DEVELOPMENT

រួមគ្នាអភិវឌ្ឍ និងធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្ម!

បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រង ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ

លេខទំនាក់ទំនង ប្រចាំតំបន់	ឈ្មោះ ៖..... លេខទូរស័ព្ទ ៖.....

12/7 HELPING SERVICE 015 48 96 96 / 012 852 842

១.រៀបចំដី និងពូជ

» ត្រាំ និងលាងសម្អាតពូជ ដោយស្រង់យកគ្រាប់ដែលអណ្តែត (គ្រាប់មិនពេញ លេញចេញ)។ សម្អាតជំងឺ និងការពារសត្វល្អិត ដោយត្រាំជាមួយ **ក្ងន់នាគ៣** ដោយប្រើ ១ដប លាយទឹក២០០លីត្រ ត្រាំពូជ ២០០គ.ក ធ្វើអោយដំណុះ លឿន និងលូតលាស់ល្អ។

» ដាស់ដីច្រើនសារធ្វើអោយដីរៀបស្មើ និងកាកសំណល់រលួយល្អ។

២.គ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃ

កំចាត់ស្មៅមុនពេលភ្ជួរ

» បាញ់ថ្នាំស្មៅកំចាត់មិនជម្រើស ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃមុនពេលភ្ជួរ។ អត្ថប្រយោជន៍ កាត់បន្ថយបរិមាណស្មៅដុះក្រោយពេលព្រួស។ បាញ់ **ឃ្លី** កំរិត ២០០-៣០០ម.ល លាយទឹក ២៥លីត្រ សម្រាប់ផ្ទៃដី៨០០ម៉ែត្រការ៉ែ។

កំចាត់គ្រាប់ស្មៅមុនពេលដុះ

» អាចបាញ់មុនពេលព្រោះ១ថ្ងៃ ឬ ក្រោយព្រួស២ថ្ងៃ ដោយប្រើ **អេហ្ស៊ីកធីវ** កំរិត ៧០-១០០ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ។ ថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលដីរាបស្មើរដីមានសំណើម និងអាចពន្លិច ទឹកនៅក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំបាន១-២ថ្ងៃ និងអាចរក្សាទឹកបានយ៉ាងតិច ២ថ្ងៃឡើង។

ប្រូតាយុំគ្រាប់ស្មៅ និងកម្ចាត់ស្មៅដែលទើបនិងដុះ(ស្មៅចម្រុះ)

» អាចបាញ់មុនពេល និងក្រោយដុះបាន (ព្រួសបាន ៥ថ្ងៃ ទៅ ៧ថ្ងៃ) ប្រើ **ប្រូតា** កំរិត ១៣០-១៥០ម.ល លាយទឹក ២៥លីត្រ ដីត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។

កំចាត់ស្មៅក្រោយដុះ

ស្មៅចម្រុះ កក់ផ្សេងៗ និងស្មៅស្លឹកធំ

» ប្រភេទស្មៅ បែកក្បាល (ស្មៅគល់ក្រហម) ច្រាច់ ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅកក់ ប្រើ **ស្ពេចស្មៅ** កំរិត (១៥-២០ម.ល) លាយប្រេងជម្រាប (៣០- ៤០ម.ល) លាយទឹក២៥លីត្រ សម្រាប់ផ្ទៃដី ៨០០ម៉ែត្រការ៉ែ។

» ប្រភេទស្មៅស្រូវ ស្មៅបែកក្បាល គ្រប់ប្រភេទ ស្មៅកន្ទុយកន្ទ្រាក ប្រើ **មេតាប៊ីស** កំរិត (១០០-១៥០ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ)។

» ប្រភេទកក់គ្រប់ប្រភេទ ប្រើ **ប្រេក** ចន្លោះ ១០០ម.ល លាយទឹក២៥ លីត្រ។

» ប្រភេទសម្លាប់ ជ្រាបតាមឫសស្មៅ ដោយលាយជីបាចៈ កំចាត់ស្មៅ បែកក្បាល កក់ ពពួកស្មៅស្លឹកធំ គ្រប់ប្រភេទ ប្រើ **ប៉ាស៊ីអ៊ីរ** (៦០០-800 ក្រាម) លាយជីបាច់ផ្ទៃដី១ហិកតា។

៣.គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត

» ទ្រីបជញ្ជក់លើស្លឹក ប្រើ **ស្ពេចនាគ៥** (២៥-៤០ ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ) សម្រាប់ផ្ទៃដី ៨០០ម៉ែត្រការ៉ែ។

» ដង្កូវស៊ីកាត់ស្លឹក មូរស្លឹក និងស្ទឹងដើម ប្រើ **ស្ពេចនាគ៣** (៣០-៤០ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ) ឬប្រើ **បេតាហ្ស៊ី** (២៥-៣៥ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ) សម្រាប់ផ្ទៃដី ៨០០ម៉ែត្រការ៉ែ។

» មមាចគ្រប់ប្រភេទ៖ ប្រើ **ប៊ូស** (កំរិត ៥០ម.ល លាយទឹក២៥លីត្រ) អាចលាយជាមួយ **ក្ងន់នាគ៦** ឬ **អ៊ីមីត**។



៤.គ្រប់គ្រងជម្ងឺ

រលួយគល់ដោយបាក់តើ បាក់តើរលាកលើស្លឹក ឆ្នូតស្លឹក បាក់តើរលាកគ្រាប់ ការពារដោយប្រើ **នាគនេត** (៣០-៤០ក្រាម លាយទឹក២៥លីត្រ) ឬ **ខប់ទ្រី** (៣៥-៤០ក្រាម លាយទឹក២៥លីត្រ)។

ជំងឺប្លាស់ លើស្លឹក អុចត្នោត ឆ្នូតត្នោត ប្រើ **ខប់ទ្រី** កំរិត (៣៥- ៤០ ក្រាម) លាយទឹក២៥លីត្រ។

លាកកក្ករ ជំងឺប្លាស់ លើថ្នាំង ប្លាស់លើកក្ករ ប្រើ **អង្គរនិរតី** (២០- ២៥ ម.ល) លាយទឹក២៥លីត្រ។

អុចត្នោត ធ្សូងម្រែងត្លើង ការពារដោយប្រើ **អង្គរឥសាន** (២០-២៥ ម.ល) លាយទឹក ២៥លីត្រ។