កម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីបំប៉ន គ្រប់គ្រងជម្ងឺ និងសត្វល្អិតលើបន្លែស្លឹក

ANGKOR SALAD

ដំណាំបន្លែស្លឹក ស្ពៃតឿ ស្ពៃក្រញាញ់ ស្ពៃចង្កឹះ ស្ពៃជើងទា ឆៃថាវ ស្ពៃក្តោប ស្ពៃបូកគោ ខាត់ណាដើម និងខាត់ណាផ្កា

	ក្នុងដំណាំ		ដំណាក់កាលលូតលាស់		ដំណាក់កាលបង្កើនផល	
	កម្រិតប្រើប្រាស់	ប្រសិទ្ធភាព	កម្រិតប្រើប្រាស់	ប្រសិទ្ធភាព	កម្រិតប្រើប្រាស់	ប្រសិទ្ធភាព
បាញ់ស្រោចដី និងដើមស្លឹក	រ៉ាឌីក =២លីត្រ/ហិកតា ហ្គេនអាប់ =២លីត្រ/ហិកតា	ជួយឲ្យដំណាំ ចាក់ឫសរឹងមាំដុះឫសច្រើន ជម្រុញការលូតលាស់លឿន និងជួយបង្កើនគុណភាពជីដាំដំណាំ	រ៉ាឌីក =២លីត្រ/ហិកតា ហ្គេនអាប់ =២លីត្រ/ហិកតា	ជួយឲ្យដំណាំស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានច្រើន និងធ្វើអោយដំណាំមានសុខភាពល្អ	តាខេ =២០-៤០ម.ល	បង្កើនគុណភាពកសិផលសម្បូរត្លឹ និងមានទម្ងន់
ការពារសត្វល្អិត	ទៀកគូ ទៀកគូខ្មៅ ច្រើនកើតដំណាក់កាលកូនដំណាំ និងដំណាក់កាលលូតលាស់	ស្រកានាគ =២០-៣០ក្រាម	រុយផែនទី ចៃ ច្រើនកើតដំណាក់កាលកូនដំណាំ និងដំណាក់កាលលូតលាស់	ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវស៊ីត្រួយ ដង្កូវកាត់ដើម ដង្កូវបាក់ខ្នង	ឬ	ដង្កូវស៊ីត្រួយ ដង្កូវកាត់ដើម ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវបាក់ខ្នង
ការពារ ព្យាបាលជម្ងឺផ្សិត និងបាក់តើ	**ជម្ងឺផ្សិត** តើហ្វិក =៣០-៥០ក្រាម ឬ អង្គរល្ងាសាន្ត =២០-២៥ម.ល	ត្រម៉ោងឬស ផ្សិតរលួយទន់ ផ្សិតលឿងសំឡី ការពារ ព្យាបាលជម្ងឺផ្សិត	**ជម្ងឺបាក់តើ** ខប់ទ្រី =២៥-៣០ក្រាម ឬ នាគទេព =២៥-៣០ក្រាម	រលួយទន់ រលួយខ្មៅ រលួយខ្មៅ  ការពារ ព្យាបាល ជម្ងឺបាក់តើ